



NAC

N-Acetyl-L-Cysteïne

Zwavelhoudende stof, bron van L-cysteïne,
precursor van gereduceerd glutathion

- Aanbevolen gebruik:** 1 tot 2 x per dag 1 capsule van 500 mg met water innemen.
Bij voorkeur een half uur voor de maaltijd.
In België: 1 capsule á 299 mg. *NAC 500 mg is in België niet toegestaan.*
- Ingrediënten per V-caps:** 500 mg (of 299 mg) N-Acetyl-L-Cysteïne
- Hulpstoffen:** Microkristallijne cellulose. Capsule: HPMC
NAC 299 mg: Rijstconcentraat (*oryza sativa*). Capsule: HPMC
- Interacties:** Niet bekend
- Waarschuwingen:** Informeer uw arts of apotheker bij maagklachten en gelijktijdige inname van geneesmiddelen.
- Opmerking:** Niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar.

NAC	Art.Nr.	EAN	[NL] Z-Index	[B] CNK	[B] NUT/PL
120 V-capsules - 500 mg	26694	8715216266943	15475204	2596-179	
In België: 100 V-capsules - 299 mg	26699	8715216266998	16891309	4147-435	1149/65

NAC (N-acetyl-L-cysteïne) is een zwavelhoudende stof, een bron van het aminozuur L-cysteïne en precursor van gereduceerd glutathion.

Cysteïne is een bouwsteen van glutathion.

